



Puffin cendré © J.M. Bompard



CONSERVATION  
DES PUFFINS  
SUR LES ÎLES D'HYERES


Illustration © N. Müller-Sbringio




ENSEMBLE PROTÉGEONS LES OISEAUX MARINS

► [www.puffin-hyeres.org](http://www.puffin-hyeres.org)







**Goéland leucopée**  
*Larus michahellis*  
 Yellow-legged Gull  
 Espèce commune très opportuniste, plumage brun-roux chez les jeunes.




**Mouette riieuse**  
*Larus ridibundus*  
 Black-headed Gull  
 Capuchon chocolat en été, tâche grise derrière l'œil en hiver.




**Sterne caugek**  
*Sterna sandwicensis*  
 Sandwich Tern  
 Capture les poissons en plongeant après un vol stationnaire.




**Grand Cormoran**  
*Phalacrocorax carbo*  
 Great Cormorant  
 Obligé de faire sécher son plumage perméable au soleil.




**Tadorne de Belon**  
*Tadorna tadorna*  
 Common Shelduck  
 Une fois éclos les poussins se regroupent en crèche.




**Fou de Bassan**  
*Morus bassanus*  
 Northern Gannet  
 Capture les poissons après un piqué vertigineux à près de 100 km/h.




**Puffin yelkouan**  
*Puffinus yelkouan*  
 Yelkouan Shearwater  
 Il capture ses proies lors de plongées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.



**Puffin cendré**  
*Calonectris diomedea diomedea*  
 Cory's Shearwater  
 Il est souvent observé à l'arrière des chalutiers se nourrissant des rejets de pêche.



**Océanite tempête de Méditerranée**  
*Hydrobates pelagicus melitensis*  
 European Storm-petrel  
 De petite taille, il « cueille » de son vol papillonnant crustacés et zooplancton à la surface de l'eau.



**Cormoran huppé de Méditerranée**  
*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*  
 European Shag  
 Il se nourrit lors de pêches collectives dans les eaux côtières.


**Tableau de présence**

La période de la reproduction occupe la majorité du cycle biologique annuel de ces oiseaux marins.

recherche du site de nidification, ponte, de l'éclosion à l'envol, en mer

Espèce	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Puffin yelkouan	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche
Puffin cendré	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche
Océanite tempête	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche
Cormoran huppé	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche

F. Larrey © Regard vivant



Puffin cendré



Océanite tempête

Une vie pélagique, un terrier en falaise, un chant étonnant caractérisent ces oiseaux endémiques de Méditerranée

Après plusieurs mois de haute mer, ces oiseaux regagnent les falaises durant la nuit pour chercher un terrier entre les blocs rocheux. Les nuits sans lune, leur chant, mélange de plaintes lascives et de pleurs d'enfants, monte des falaises abruptes. Les parents se relaieront pour la couvaison et l'élevage du jeune (proies exclusivement marines : poissons, crustacés). Un jour d'été les parents arrêtent de nourrir leur poussin, la faim le poussera à quitter son terrier. Plusieurs années s'écouleront avant qu'il ne revienne nicher à proximité de son terrier de naissance.




© J.-M. Bompar



© J.-M. Bompar



M. Lascève © LPO



Puffin yelkouan © F. Diermaier